



Ulyte[®]

Soporte nutricional de procesos
diarreicos formulado para
perros y gatos



Ulyte[®]

Una completa formulación para un rápido retorno a la normalidad



Propiedades de Ulyte[®]

Recuperación del medio intestinal alterado	Probióticos, prebióticos, acidificantes y glutamina
Poder secuestrante de toxinas, bacterias y virus	Montmorillonita y carbón activado
Aporte de electrolitos	Cloruro sódico, potásico y magnésico
Aporte de una fuente energética	Dextrosa y sorbitol
Control de borborismos y flatulencias	Carbón activado que actúa como biocaptador de gases intestinales
Acción compactante de heces	Montmorillonita y harina de algarroba
Recuperación del enterocito alterado	Glutamina

¿Cuándo usar Ulyte[®]?

Soporte nutricional en el tratamiento sintomático de:

- Diarreas de origen vírico, bacteriano o parasitario.
- Diarreas causadas por alteraciones o cambios en la dieta.
- Alteraciones digestivas causadas por un desequilibrio en la microflora intestinal originado por tratamientos con antibióticos, viajes, periodos de estrés etc
- Siempre que se necesite restablecer y/o mantener el equilibrio de la flora intestinal.

*2 días de tratamiento son suficientes en la mayoría de procesos diarreicos



Registro Sanitario No. 16A1-A2-14836-AGROCALIDAD

Ulyte[®]

Alimento complementario dietético.

Composición: Dextrosa, harina de algarroba, glicerina, hidrolizado de soja (rico en glutamina), fructoligosacáridos, carbón vegetal, cloruro sódico, cloruro potásico, cloruro de magnesio.

Aditivos: microorganismos 4b1705 Enterococcus Faecium - NCIMB 10415 5,5 x 10⁷ UFC/l), agentes ligantes y antiaglutinantes E 558 (Montmorillonita 290.000 mg/l), sustancias aromáticas y apetentes, estabilizadores.

Componentes analíticos: Ceniza bruta (18,20%), Proteína bruta (2,10%), Aceites y grasas brutas (0,03%), Humedad (21,9%), Fibra bruta (0,35%), sodio (2,5 %), potasio (0,5 %).

Objetivo de nutrición específico: reducción de los trastornos agudos de la absorción intestinal.

Indicaciones: soporte nutricional en el tratamiento sintomático de:

- Diarreas de origen vírico, bacteriano o parasitario.
- Diarreas causadas por alteraciones o cambios en la dieta.
- Alteraciones digestivas causadas por un desequilibrio en la microflora intestinal originado por tratamientos con antibióticos.
- Viajes, periodos de stress prolongados etc.
- Siempre que se necesite restablecer y/o mantener el

equilibrio de la flora intestinal.

Dosis: se debe aplicar la dosis indicada en la tabla adjunta, 2 veces al día. En caso de diarreas severas, la dosis puede duplicarse, siempre a criterio veterinario. Su uso puede prolongarse hasta 1-2 semanas, aunque, habitualmente, son suficientes dos días de tratamiento. No está recomendada su utilización en cachorros que no hayan sido destetados.

	<10 Kg	11-25 kg	26-40 kg	>40 kg
ml por dosis	2 ml	4 ml	6 ml	8 ml

Especies de destino: perros y gatos.

Modo de empleo: retirar la tapa de la punta de la jeringa. Para obtener la dosis deseada, girar la rueda hasta seleccionar los ml necesarios. Cada división corresponde a 1ml. Después de seleccionar la dosis presionar el émbolo y aplicar directamente en la boca del animal (por un lateral) depositando la pasta en la parte posterior de la lengua para facilitar la ingestión.



Uranovet SL

Nº Entidad autorizada ESP08600759
Avda. Santa Eulàlia, 2
08520 Les Franqueses | Barcelona (Spain)
www.uranovet.com

T +900 809 965
E info@uranovet.com

Importado y distribuido en el Ecuador por:

Corivet Cia. Ltda.
Edif. Solemni . Alemania N30-58 y Av. Eloy Alfaro Of 208
Teléfono: +593996535269
Quito - Ecuador
Email: info@corivet.com
www.corivet.com

 @Corivet.ec